

# 癌化学療法レジメン登録票

2007年2月8日 登録

削除

レジメン名

**R-CHOP療法**

申請医師名

久居 弘幸

対象癌腫	診療科	実施区分	使用区分
非ホジキンリンパ腫	消化器科	<input checked="" type="checkbox"/> 外来 <input checked="" type="checkbox"/> 入院	<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床試験 <input type="checkbox"/> 治験

	抗癌剤名	投与量	投与方法	投与時間	投与日 (day1、d8など)
1	リツキサン	375mg/m <sup>2</sup>	DIV	実施上の注意点参照	day1
2	プレドニン錠5mg	100mg/body	PO	分2	day1-5
3	アドリアシン	50mg/m <sup>2</sup>	DIV	30分	day1
4	オンコピン	1.4mg/m <sup>2</sup>	DIV	ゆっくり	day1
5	エンドキサン	750mg/m <sup>2</sup>	DIV	120分	day1

1クールの間

21日

総コース数

6~8コース

投与スケジュール IV(アドリアシン・オンコピン) DIV(アドリアシン・オンコピン)

Rp	薬剤名	投与量	投与時間	投与量	投与時間	day1	day2	day3	day4	day5
1	ブルフェン錠 レスタミン・コウワ錠	2T 3T	内服	2T 3T	内服	●				
2	リツキサン 生食	375mg/m <sup>2</sup> *1	DIV *2	375mg/m <sup>2</sup> *1	DIV *2	●				
3	イメンド	125mg(day1) 80mg(day2,3)	内服 1日1回	125mg(day1) 80mg(day2,3)	内服 1日1回	●	●	●		
4	プロイメンド 生食	150mg 100mL	DIV	150mg 100mL	DIV	●				
5	カイトリル デキサート	3.0mg 9.9mg	DIV	3.0mg 9.9mg	DIV	●				
6	アドリアシン 生食	50mg/m <sup>2</sup> 20mL	IV	50mg/m <sup>2</sup> 50mL	DIV 30分	●				
7	オンコピン 生食	1.4mg/m <sup>2</sup> 20mL	IV ゆっくり	1.4mg/m <sup>2</sup> 50mL	DIV ゆっくり	●				
8	エンドキサン 生食	750mg/m <sup>2</sup> 500ml	DIV 120分	750mg/m <sup>2</sup> 500ml	DIV 120分	●				
9	プレドニゾロン	50mg/回 内服	1日2回 朝・夕	50mg/回 内服	1日2回 朝・夕	●	●	●	●	●

\*1 リツキサン使用量(mL)の9倍量

\*RP3とRP4は選択投与

\*RP6とRP7は投与方法選択可能

\*2 実施上の注意点参照

\*RP5のカイトリルは他の5-HT薬に変更可能

\*リツキサン中止時RP1, 2は止め

実施上の注意点

初回投与時は、最初の1時間は25mg/時の速度で点滴静注を開始し、患者の状態を十分観察しながら、その後注入速度を100mg/時に上げて1時間点滴静注し、さらにその後は200mg/時まで速度を上げることができる。なお2回目以降の注入開始速度は、初回投与時に発現した副作用が軽微であった場合、100mg/時まで上げて開始できる。