

癌化学療法レジメン登録票

レジメン名

mFOLFOX6 + アービタックス

申請医師名

久居 弘幸

対象癌腫	診療科	実施区分	使用区分
大腸癌	消化器科	<input checked="" type="checkbox"/> 外来 <input checked="" type="checkbox"/> 入院	<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床試験 <input type="checkbox"/> 治験

	抗癌剤名	投与量	投与法	投与時間	投与日 (day1、d8など)
1	アービタックス *1	その他参照	DIV	60~120分	その他参照
2	エルプラット	85mg/m ²	DIV	120分	day1
3	アイソボリン(レボホリナート)	200mg/m ²	DIV	120分	day1
4	5-FU	400mg/m ²	IV	ゆっくり	day1
5	5-FU	2400mg/m ²	持続点滴 静注	46時間	day1 (→2)

*1: 皮膚障害予防のためミノマイシンの内服を検討して下さい

1クルールの期間

総コース数

14日

PDまで

投与スケジュール

Rp	薬剤名	投与量	投与時間	day1	day2	day3	day8
1	ポララミン 生食	5mg 50mL	DIV	●			●
2	デキサート 生食	9.9mg 20mL	IV	●			●
3	アービタックス 生食	*1 全量250mL	DIV 60~120分	●			● (休)
4	生食	50mL	DIV				●
5	カイトリル	3.0mg	DIV	●			
6	デカドロン	8mg	内服 1日1回		●	●	
7	アイソボリン 5%Glu	200mg/m ² 250mL	DIV 120分	●			
8	エルプラット 5%Glu	85mg/m ² 250mL	DIV 120分	●			
9	5-FU	400mg/m ²	IV ゆっくり	●			
10	5-FU 生食or5%Glu	2400mg/m ² 薬局で調節	持続点滴静注 46時間	●	⇨		

*1 実施上の注意点参照

*Rp1, 2, はアービタックス投与30~60分前

*RP5のカイトリルは他の5-HT薬に変更可能

*RP8はRP7と同時に投与開始

実施上の注意点

アービタックスは毎週 (day1, 8) または隔週 (day1のみ) 選択可能
 毎週投与時は初回400mg/m²・維持250mg/m²で投与する
 隔週投与時は初回・維持共に500mg/m²で投与する。