

# 癌化学療法レジメン登録票

2019年8月5日 登録

削除

レジメン名

G-B療法

申請医師名

今川 貴之

対象癌腫	診療科	実施区分	使用区分
CD20陽性濾胞性リンパ腫	内・消化器科	<input checked="" type="checkbox"/> 外来 <input checked="" type="checkbox"/> 入院	<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床試験 <input type="checkbox"/> 治験

	抗癌剤名	投与量	投与法	投与時間	投与日 (day1、d8など)
1	ガザイバ『フィルター使用』	1000mg	DIV	実施上の注意 点参照(*3)	「1コース」day1,8,15 「2コース以降」day1
2	トリアキシン	90mg/m <sup>2</sup>	DIV	60分	day1、2

1クールの間

28日→56日

総コース数

6コース→12コース

## 投与スケジュール

導入療法(6コース)

維持療法(12コース)

Rp	薬剤名	投与量	投与時間	day1	day2	day3	day4	day8	day15	day1
1	カイトリル デキサート	3.0mg 9.9mg	DIV *1	●	●			(●) 1コース	(●) 1コース	
2	デキサート 生食	6.6mg 20mL	IV							●
3	デカドロン	8mg	内服 1日1回			●	●			
4	ブルフェン錠 レスタミン・コーワ錠	2T 5T	内服 *2	●				●	●	●
5	ガザイバ 生食	1000mg 全量250mL	DIV *3	●				●	●	●
6	経過観察		30分以上	●						
7	トリアキシン 注射用水 生食	90mg/m <sup>2</sup> 全量250mL	DIV *4 60分	●	●					

\*1~4 実施上の注意点参照

\*RP4のカイトリルは他の5-HT薬に変更可能

実施上の注意点	デキサート・カイトリル(*1)は、ガザイバ投与1時間前までに投与を完了させる。 ブルフェン・レスタミン(*2)は、ガザイバ投与30分以上前に内服する。 ガザイバの投与速度(*3): 初回投与時; 50mg/時の速度で点滴静注を開始し、患者の状態を十分観察しな 30分毎に50mg/時ずつ最大400mg/時まで上げることができる。 2回目以降; 前回投与でG2以上のinfusion reactionが出現しなければ、100mg/時 で投与開始し30分毎に100mg/時ずつ最大400mg/時まで上げることができる。 トリアキシン25mgにつき注射用水10mLで溶解「生食で希釈し250mLにする」(*4)
---------	---