

癌化学療法レジメン登録票

2007年7月15日 登録

削除

レジメン名

DA-EPOCH-R療法

申請医師名

久居 弘幸

対象癌腫	診療科	実施区分	使用区分
悪性リンパ腫	消化器科	<input checked="" type="checkbox"/> 外来 <input checked="" type="checkbox"/> 入院	<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床試験 <input type="checkbox"/> 治験

	抗癌剤名	投与量	投与法	投与時間	投与日(day1、d8など)
1	リツキサン	375mg/m ²	DIV	実施上の注意点参照	day1
2	ベプシド	50mg/m ²	DIV	24時間	day2-5
3	オンコビン	0.4mg/m ²	DIV	24時間	day2-5
4	アドリアシン	10mg/m ²	DIV	24時間	day2-5
5	エンドキサン	750mg/m ²	DIV	120分	day6

1クールの間

21日

総コース数

PDまで(リツキサンは8回まで)

投与スケジュール

Rp	薬剤名	投与量	投与時間	day1	day2	day3	day4	day5	day6	day7	day8	day9
1	レスタミン ブルフェン	50mg 200mg	内服 1回	●								
2	リツキサン 生食	375mg/m ² *1	DIV *2	●								
3	イメンド	125mg(day2) 80mg(day3,4)	内服 1日1回		●	●	●					
4	ブロイメンド 生食	150mg 100mL	DIV		●							
5	カイトリル デキサート	3.0mg 9.9mg	DIV		●	●	●	●	●			
6	デカドロン	8mg	内服 1日1回							●	●	●
7	ベプシド オンコビン	50mg/m ² 0.4mg/m ²	DIV 24時間		●	●	●	●				
8	アドリアシン 生食	10mg/m ² 500mL										
9	エンドキサン 生食	750mg/m ² 100mL	DIV 120分						●			
10	プレドニゾン	50mg/回 内服	1日2回 朝・夕		●	●	●	●	●			

*1 リツキサン使用量(mL)の9倍量

*2 実施上の注意点参照

*RP3とRP4は選択投与

*RP5のカイトリルは他の5-HT薬に変更可能

*リツキサン中止時RP1, 2は止め

実施上の注意点

初回投与時は、最初の1時間は25mg/時の速度で点滴静注を開始し、患者の状態を十分観察しながら、その後注入速度を100mg/時に上げて1時間点滴静注し、さらにその後は200mg/時まで速度を上げることができる。なお2回目以降の注入開始速度は、初回投与時に発現した副作用が軽微であった場合、100mg/時まで上げて開始できる。